

n^o 95
deux pièces et un dessin.

1^{er} Mémoire

Contenant une observation d'anatomie
et une de chirurgie, Envoiyé à l'académie
royale de chirurgie, le 14. juin 1778. -

par m. viguerie chirurgien
gagnant maîtrise dans l'hôtel dieu
de toulouse.



ARC 15 d. 61 m^o 7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

de Londres.
paysant en action dans l'hôtel de
Paris. vignette chirurgien
royale de chirurgie, le 14 juin 1778.
et une de chirurgie, le 14 juin 1778.
Contenant une observation d'anatomie

La chirurgie pratique a tous les
jours dans son domaine, des maladies
dont les causes & les effets trompent
la plus grande sagacité & l'expérience
la plus consommée, ne sauroient
pourtant échapper aux Recherches
exactes et soutenues & à l'œil vigilant
d'un anatomiste observateur: C'est -
en effet à l'anatomie que l'art de
guérir doit la plus grande partie de
ses progrès et que le praticien est
redevable du succès dans ses —
opérations: mais il ne suffisoit pas
aux chirurgiens de Recueillir des —
observations et de faire des Cures —
heureuses, il leur falloit encore un
entrepôt où ils pussent Consigner
le fruit de leur travail et de leurs —
veilles, pour augmenter la somme



2 Des découvertes en anatomie et ^{en} chirurgie
et Contribuer par là au nouvel —
accroissement dont ces deux sciences
sont susceptibles. l'académie royale
de chirurgie procure ce double avantage:
avant son établissement, l'on voyoit
une foule d'écrivains qui plus avides
de devenir auteurs, que jaloux d'être —
utiles à l'humanité, rapportoient
des cas quelquefois mal vus, souvent
~~isolés~~ supposés, toujours isolés et —
destitués de preuves; mais depuis —
l'époque de sa fondation, la chirurgie
et l'humanité se sont enrichies d'un
très grand nombre d'observations bien
faites, réunies en un seul corps de —
doctrine, qui sert de guide et de boussole
à tous ceux qui aspirent à une —
réputation brillante et bien méritée
dans l'art de guérir. C'est dans le sein
de cette savante société que tous les
matériaux qui doivent entrer dans le
riche et solide Edifice de la chirurgie,

sont préparés, disposés, assemblés ³
et mis en œuvre, pénétré de cette idée et
flatté de l'espoir d'être encouragé dans
ma première démarche vis à vis de
l'académie, j'ai l'honneur de lui offrir
les observations que m'a fourni le
commencement de ma pratique dans
l'hôtel dieu de Toulouse; elles m'ont
paru d'autant plus intéressantes qu'elles
ne sont pas communes: je les soumets
avec confiance au jugement de cette
compagnie respectable, que je prie de
vouloir bien m'éclairer, en supposant
que j'aie mal vu.

Observation anatomique,
Sur

une hernie de 18 ans, compliquée
d'étranglement par le sac, qui seut
réduit par le taxis, contre l'opinion
la plus commune.

Les hernies sur lesquelles les anciens
n'étoient pas fort instruits, sont de
toutes les maladies chirurgicales, celles



4. qui fournissent les cas les plus rares
et les plus compliqués, comme il consta
de l'observation suivante.

Le nommé pierre Bignal domestique,
agé de 50 ans, natif du village de
montjoire, au diocèse de toulouse,
seut tourmenté le mardi soir 29^e
juillet 1757, par des douleurs violentes
de Colique, avec vomissement et
suppression des selles. le lendemain
matin 30. m. Beque, membre du
collège de chirurgie de toulouse, seut
prié de voir le malade, il lui trouva
un entéroccèle inguinal, au côté droit,
du volume d'un petit œuf de poule; il
le fit rentrer de suite complètement;
c'est à dire, avec son sac, par le taxis:
mais les accidens persistant toujours,
le malade seut porté à l'hôtel dieu, le
soir du même jour 30. je le questionnai
sur ce qui avoit précédé son état actuel,
il me répondit qu'il portoit depuis -

18 ans, une descente, au côté droit 5.
du petit ventre; qu'il la faisoit rentrer
aisément et qu'il la contenoit par un
bandage; mais que les parties s'étant
échappées de nouveau par dessous la
pelote du dit bandage, il n'avoit pu les
réduire depuis deux jours, ce qui avoit
donné lieu aux accidens qu'il éprouvoit
alors, et qu'il avoit l'obligation à m-
Becqué de les lui avoir réduits.

je crus d'abord pouvoir rapporter
l'intensité et la persévérance des
accidens 1^o à la contusion que l'intestin
avoit souffert tant de la part de la pelote
du Brayer, que de celle du taxis
2^o à l'atonie du Canal intestinal, causée
par l'engouement des matières. les
saignées furent répétées, pour combattre
la contusion de l'intestin et en prévenir
l'inflammation; et je mis en usage
contre son atonie, les lavemens émolliens
et les purgatifs avec la moelle de Carse et
le sel d'epsom.

6. Le 31. juillet le malade bien loin -
d'être soulagé, alloit au contraire toujours
en dépérissant: je pouvais plus loin mes
recherches j'examinai le bas ventre,
je le trouvais tendu et douloureux; je
portai à la faveur de l'anneau que je
trouvai fort dilaté, mon doigt dans le
ventre, aussi avant qu'il me fût possible,
je fis tousser le malade: tout ce procédé
m'apprit seulement que les parties -
internes que je touchois, n'étoient pas
plus sensibles que naturellement; j'étois
fort embarrassé pour arseoir mon -
jugement sur la véritable cause des -
accidens: l'étranglement par le sac -
rentre me parut impossible; d'après
les réflexions de monsieur Louis: je
^{ne soupçonnai pas}
non plus l'étranglement ~~formé~~ par l'intestin
lui même, observé par Ritsch; mais
celui que l'immortel Lapeyronnie
rapporte avoir vu, formé par l'épiploon,
me parut plus vraisemblable: pour
m'en assurer, je fis pencher le malade

en arrière, afin de tendre davantage
cette coiffe grasseuse et d'aggraver les
accidens; mais cela ne m'instruisit de
rien; je fis prendre le malade sous les
aisselles par deux hommes vigoureux,
qui le firent marcher et sauter, et il ne
me fut pas possible de faire reparoitre
la hernie: le malade étoit très-foible,
il éprouvoit des Syncopes fréquentes: le
peu de sensibilité des parties qui
environnoient la circonférence intérieure
de l'anneau, et les douleurs vives
auxquelles le malade étoit en proie et
qui s'étendoient dans tout le bas-ventre,
me firent soupçonner la paronélie.
Dans une Conjoncture si délicate, j'appelai
M. Frizac, intendant de Chirurgie à l'hôtel
Dieu, pour examiner ensemble le malade;
nous convinmes que l'opération du
Bubonocèle seroit hasardée, nous
arrêtâmes qu'il falloit insister sur les
saignées, les lavemens émolliens et les
purgatifs minoratifs et nous renvoyâmes



8. au lendemain un second examen ;
mais les accidents ayant augmenté -
pendant la nuit, le malade y succomba
et mourut le 1.^{er} août à 5 heures du matin.
le même jour à 6 heures du soir, je
fis l'ouverture de son cadavre en -
présence de mm Dubernard et Brunet
médecins ordinaires de l'hôtel Dieu,
et de m. Firac : je trouvais le duodénum,
le jéjunum et presque tout l'iléum, -
boursofflés et enflammés, ce dernier
portoit une tache gangréneuse ; je
découvris derrière l'anneau, un sac
de deux pouces, deux lignes de longueur,
et de quatre pouces de circonférence,
recouvert extérieurement d'un tissu
cellulaire assez épais et parsemé -
de plusieurs petites glandes (planche
fig. 1.^{re}) :
ce sac étoit rétréci à sa partie supéri.
et renfermoit une portion de l'extrémité
cœcale de l'iléum (fig. 1.^{re}) qu'il étrangloit
(c'est l'étranglement qui sent la seule cause

De la mort du malade); je fis une 9
ligature à chaque portion d'intestin
qui répondoit au sac; je coupai toute
cette portion et je la laissai dans le sac.
le péritoine étoit bombé vers le ventre;
je le soulevai du côté des muscles psoas,
iliaque et des os pubis: le tissu qui -
l'unissoit dans tous ces endroits, étoit -
fort lâche et fort épais; j'enlevai le sac
herniaire avec la portion d'intestin
qu'il contenoit; je l'ouvris en présence
des sursdits médecins et intendant de
Chirurgie, à sa partie antérieure et
inférieure (Fig. 2.) ; il en sortit environ
demi once d'une sérosité rougeâtre;
l'intestin étoit ramassé à la partie
moyenne et supérieure du sac, et ~~il~~
adhérent à sa surface interne; mais
ces adhérences étoient faciles à détruire:
comme cet intestin étoit moitié vide,
je défis ses ligatures, je le comprimai
et j'en fis sortir par les deux bouts, une
sérosité semblable à la lèvre des chairs

10 je retirerai cet intestin de dedans le sac,
pour examiner l'étendue et le degré
d'inflammation de la portion
étranglée; elle avoit quatre pouces et
demi de longueur et étoit menacée
de gangrène (Fig. 3^e)
(A — B)

D'après cet exposé dont j'ai voulu
confirmer la certitude par la planche
ci jointe, dessinée sous mes yeux, les
parties encore en place, que j'ai mise
dans l'esprit de vin, pour les envoyer
à l'académie, si elle les veut, il
n'est sans doute pas nécessaire que je
m'étende beaucoup pour prouver la
réductibilité du sac herniaire dans
les vieilles hernies et les avantages que
l'humanité et la chirurgie pourront
retirer de mon observation.

Je sais que plusieurs praticiens d'un
grand poids sont dans la ferme croyance
que le sac ne rentre jamais dans les
vieilles hernies; je l'avois aussi toujours

11
en, surtout depuis que M. Louis
a voulu le prouver par une dialectique
qui lui est propre et par une théorie
d'autant plus séduisante qu'elle a
paru jusqu'à ce jour ne pouvoir être
révoquée en doute: mais quelque
déférence qui soit due aux opinions
de ce physiologiste, l'on ne doit point
se refuser à l'évidence que porte
avec elle une observation bien vue
et bien constatée: j'avoue avec cet
académicien, que dans le plus grand
nombre de ces hernies, le sac adhère
au cordon des vaisseaux spermaticques,
au tissu cellulaire qui recouvre le
dartos et à celui qui avoisine l'anneau,
et qu'alors la réduction du sac par
le taxis, est impossible; mais il doit
convenir à son tour, que cela n'arrive
pas toujours, puisque dans celle-ci, ces
adhérences n'existoient pas, ou si elles
existoient, elles étoient aisées à détruire.

on sait que le péritoine est sans cesse
 lubrifié par une humeur qui en -
 empêche l'adhésion dans les hernies
 récentes; mais cela n'a pas lieu, ~~mais~~
 dira-t-on dans les anciennes, parce que
 le sac se trouvant tendu et comprimé,
 d'un côté par la pelote du Brayes, de
 l'autre par les parties adjacentes, —
 s'adhère à ces parties et ne peut être
 réduit: cette règle est généralement
 vraie; je conviens même que l'examen
 anatomique du sac herniaire de mon
 malade, représenté au naturel —
 par la planche, semble la favoriser
 en partie: on voit en effet que —
 l'ouverture de ce sac est très rétrécie,
 d'une texture beaucoup plus épaisse
 et plus forte que le reste de son étendue;
 qu'elle est ligamenteuse et béchante
 (fig. 2^e) Or, 1^o si ce sac étoit rentré —
 B. chaque fois que le malade réduiroit
 sa hernie, il n'auroit pas resté long-
 temps dehors, puisqu'il la réduiroit

Sitôt qu'elle paroîroit; Conséquemment
 son ouverture n'auroit pu être ni -
 comprimée, ni étranglée, ni rétrécie
 par l'anneau. . . 2.^o Le sac avoit été
 libre dans le ventre et éloigné de toute
 compression; son ouverture n'auroit
 pas conservé la figure ovale que -
 l'anneau lui a imprimée, elle seroit
 moins épaisse et plus irrégulière.
 ces raisons toutes favorables qu'elles
 paroissent à l'opinion Commune,
 semblent prouver tout au plus, que
 mon malade feroit rentrer seulement
 les parties renfermées dans le sac; mais
 elles ne démontrent point l'existence
 des adhérences du moins indestructibles.
 je serois même porté à croire que
 quoique vraisemblablement le sac
 n'ait ~~été~~ jamais été réduit que par
 m. Bégué, les adhérences n'ont existé
 en aucun temps, et que le malade -
 auroit peut-être réussi avec un peu -
 de méthode et d'attention, à le faire



14. rentrer: voici sur quoi je me fonde.
j'ai dit plus haut que le sac étoit
recouvert d'un tissu cellulaire assez
épais et parsemé de plusieurs glandes;
ce tissu cellulaire d'une part rendoit
la compression du sac par l'anneau
et par les parties voisines, plus médiante
et moins forte, et ces glandes de l'autre,
filtoient une humeur qui remplissoit
les loges de ce tissu et en empêchoit
l'adhésion; il ne doit donc pas
paroître surprenant si pendant la
manœuvre de M. Bégué, ce tissu qui
avoit jusqu'alors entretenu par son
humidité la souplesse et le relâchem.
des parties, non seulement permit,
mais même facilita la rentrée du sac.
ce n'est point ici le cas d'opposer
comme un obstacle invincible à la
rentree du sac, le volume, ni la
consistance de la tumeur, puisqu'il
est d'expérience que les parties qui la
forment, ne rentrent point en une

15.
seule masse, ou en Bloc, selon
l'expression Énergique de feu garangeot,
mais seulement l'une après l'autre :
en supposant même que toutes les
hernies, pour être réductibles, dussent
avoir peu de volume et peu de
consistance, celle dont il s'agit,
pouvoit être réduite facilement,
puisque elle n'avoit que la grosseur
d'un petit œuf de poule, que son sac
n'étoit pas tendu comme un Ballon;
qu'il étoit au contraire assez molet
et que la sérosité qu'il contenoit lui
permettant de prendre différentes
figures et de se prêter à la pression
du taxis, dirigée vers son rétrécissement
vis à vis l'anneau qui avoit resté fort
dilaté, dut encore en favoriser la rentrée.
il faut en outre pour présenter la
réductibilité du sac comme possible,
supposer un décollement de la portion
du péritoine, qui couvre la surface interne

16 des muscles psoas, iliaque et transverse, pour faire place au Sac: or puisque cette poche avoit deux pouces, deux lignes depuis sa partie supérieure qui répondoit à l'anneau, jusqu'à sa partie inférieure; il falloit donc que le péritoine se décolât de deux pouces, deux lignes, pour pouvoir le loger. Je sais que cette théorie toute concluante qu'elle paroît en faveur de mon observation, ne s'accorde point avec l'état naturel des parties; mais quoiqu'il en soit, elle n'est pas moins vraie.

Supposons pour nous convaincre de cette vérité, que nous n'eussions jamais vu des hernies et que quelqu'un nous assurât en avoir vues avec un sac formé par le péritoine, nous révoquerions certainement cette assertion en doute, parcequ'il nous paroîtroit impossible que le péritoine qui répond aux ouvertures inférieures du bas ventre, prêtât tout à coup assez pour loger une masse des viscères: nous serions même fondés,

14
S'il n'y avoit que cette portion du
péritoine qui dut prêter, parce qu'alors
on verroit des hernies très rarement;
mais comme c'est plutôt le péritoine
qui avoisine ces ouvertures, qui y
concourt, en se déplaçant et en glissant
sous les muscles et les aponévroses, à la
faveur de son tissu cellulaire (déplacem^{nt}.
qui pourtant ne cause aucun dommage
dans le bas ventre); l'on ne doit donc
pas être surpris que le Sac herniaire
puisse rentrer dans le ventre par un
taxis méthodique. le tissu cellulaire
interne qui avoisine les susdites ouvertures,
et qui a déjà permis au péritoine de glisser,
peut encore lors du taxis, s'éloigner
assez des muscles qu'il recouvre, et
céder suffisamment à l'impulsion
des parties, pour les laisser rentrer.
Dans le malade de mon observation,
le Sac herniaire faisoit faire au
péritoine une convexité du côté des
muscles du bas ventre (il est vrai que
cette convexité n'avoit pas deux pouces,

18. Deux lignes d'étendue, comme le sac dont l'extrémité inférieure descendoit beaucoup plus bas que l'anneau; mais malgré cette disproportion la convexité prèta assez pour favoriser la rentrée de la poche membraneuse.

Réflexion

L'observation que je donne sans les graces et les ornemens du discours, mais telle qu'elle se trouve sur mon journal de pratique, prouve 1^o que le sac peut rentrer, dans les vieilles hernies, par un taxis méthodique, et qu'il peut après sa réduction, causer la mort. 2^o qu'il est aisé de confondre la maladie qui en fait le sujet, avec la passion iliaque, si l'on n'a égard qu'au paccidens: mais il y a des précautions essentielles, qu'un chirurgien prudent et éclairé met en usage pour se prémunir contre l'erreur. Si il voit, par exemple, un malade attaqué de vomissement, sans hernie apparente, il doit d'abord

19
examiner les endroits par lesquels
ces tumeurs se forment; s'assurer
s'ils sont douloureux, et si il y a quelque
partie pincée; porter ensuite ses
attentions sur le reste du ventre, en
parcourir toute la circonférence, pour
voir si il y a quelque cicatrice qui résulte
d'une plaie pénétrante; observer si la
doulueur que le malade ressent est
partiale; c'est à dire, si elle part d'un
seul point de cette circonférence; dans
ces deux cas, il prononce avec confiance
qu'il y a étranglement; si au contraire,
la doulueur est totale; c'est à dire, si elle
occupe toute l'étendue du ventre qui se
trouve fort tendu, il soupçonne la
passion iliaque, maladie très grave,
en ce que, suivant la remarque judicieuse
de m. Bevin elle ne présente aucun
= signe positif qui en indique la cause et
= le siège; ce qui la met absolument hors
= du domaine de la chirurgie opératoire.

j'ai déjà dit qu'en portant par
 l'anneau, mon doigt dans le ventre aussi
 avant qu'il me fût possible, je ne touchai
 aucune partie, ni ne causai la moindre
 douleur au malade; qu'au contraire
 tout le ventre étoit fort tendu et fort
 douloureux; il n'est pas surprenant
 qu'alors je n'aie point touché la poche
 herniaire à travers l'anneau, puis-
 = qu'elle en étoit éloignée et que son
 extrémité inférieure se portoit du côté
 du muscle psoas: quand même je
 l'aurois touchée, son élasticité et la
 peau qui précédoit mon doigt, m'auroient
 empêché de la bien distinguer, et je
 n'aurois jamais pu faire pression
 sur l'intestin étranglé, qui étoit la
 seule partie douée de quelque sensibilité:
 mais il n'en étoit pas de même lorsque
 je pressois le ventre, alors le malade
 souffroit vivement, parceque, comme
 je l'ai dit plus haut, le duodénum, le
 jéjunum et presque tout l'iléum

21.
étoient boursouflés et enflammés,
ces trois intestins occupant une très
grande ~~partie~~ étendue du ventre,
je devois donc nécessairement exciter
les douleurs les plus aiguës en comprimant
les régions dans lesquelles ils sont situés.

ces réflexions me paroissent démontrer
que la passion iliaque et la hernie
avec étranglement intérieur, peuvent
aisément être confondues ensemble,
et que ce n'est qu'au moyen de la plus
grande sagacité et de la plus profonde
connoissance de l'anatomie, qu'un
chirurgien peut aller droit au but.

Conclusion

Les Conséquences que l'on doit déduire
de cette observation, se présentent
naturellement à tout chirurgien
impartial et libre de tout préjugé;
c'est à dire, qu'il doit en conclure
que le défaut de semblables cas a privé
mon malade des secours qu'il auroit
pu retirer de la chirurgie opératoire:

22. en effet si l'académie avoit reçu de
pareilles observations, et si, après les
avoir bien examinées et profondément
discutées, elle les avoit munies du
Sceau de son approbation, et en avoit
publié l'authenticité, je n'aurois pas
hésité (vu l'inefficacité des moyens
ordinaires) à faire l'incision accoutumée,
à débrider l'auneau suffisamment
pour avoir la facilité de pincer le
sac, le ramener au dehors et -
détruire l'étranglement.

Observation chirurgicale Sur une

la réduction de la tête du fémur,
Luxée depuis plus de deux mois

Les vieilles Luxations ont été différem^{mt}
envisagées par les praticiens. les anciens
et même quelques modernes les ont
regardées, sinon comme incurables,
du moins comme très difficiles à -
réduire: le plus grand nombre des

modernes croit au contraire qu'elles 23.
peuvent être réduites. L'observation
suivante prouve en leur faveur.

le nommé Jacques Dupont charretier,
agé de 26 ans, natif de la ville de
grenade, au diocèse de toulouse, -
tomba de dessus une charrette le 25
9^{bre} 1775, et se luxa la cuisse droite,
en haut et en arrière. cinquante jours
s'écoulerent sans qu'on put en faire
la réduction; le malade se fit trans-
porter à l'hôtel dieu; je mis d'abord
en usage les saignées; les topiques
émolliens et relâchans ^{et les résolutifs} furent continués
pendant plusieurs jours, après lesquels
je tentai la réduction par les moyens
simples et ordinaires, mais je ne
l'obtins que par le secours de la moufle.

assuré d'avoir ramené la tête de
l'os fémur dans la cavité cotiloïde
des os innominés, je fus pourtant
surpris de trouver cette extrémité

24. plus longue que l'autre. pour me
mieux convaincre de la réduction, je
placai la Colonne vertébrale, le bassin
et les deux extrémités inférieures sur la
même ligne, et j'observai très bien
soit au genou, soit au pied, la différence
de longueur des deux extrémités. le malade
ressentoit une douleur des plus vives -
dans toutes les parties adjacentes à
l'articulation; tous les muscles en
étoient si tendus, qu'il étoit impossible
de reconnoître ni la tête, ni la cavité
articulaire, ni le trou ovalaire; l'on
pouvoit porter la Cuisse malade
indistinctement un peu en dedans,
ou en dehors, sans causer de douleur,
mais le malade en ressentoit une
très vive. si l'on étendoit ces mouvements.
je le fis mettre debout, j'examinai
de nouveau les extrémités, et la
malade me parut toujours plus
longue que l'autre; mais le 6.^e jour
après la réduction, je m'aperçus qu'elle

li'étoit moins et depuis alors cette 25
longueur diminua si sensiblement,
que le 15^e jour les extrémités furent
parallèles et dans leur état naturel;
enfin au bout du mois le malade
seut guéri; il a depuis repris ^{de son état} les
fonctions, et il s'occupe aujourd'hui
aux travaux les plus pénibles.

cette observation prouve 1^o l'amas
de la sinovie dans les cavités articulaires,
lorsque les têtes qu'elles logent naturellement
en sont sorties (il n'est pas possible de
reconnoître une autre cause qui ait
empêché de réduire la luxation, à
moins que l'on veuille en accuser le
gonflement des glandes sinoviales,
ce qui est moins probable)... 2^o que
cette sinovie peut être divisée par
la pression que la tête de l'os fait
continuellement sur elle, et qu'elle
peut permettre de réduire la luxation...
3^o enfin que dans toutes les anciennes
luxations, l'on doit avoir égard à



26. l'épaississement de cette humeur, pour
éviter de commettre des fautes très graves,
dans lesquelles je serois tombé, si j'eusse
suivi l'avis de quelques Consultants qui
vouloient que la tête du fémur appuyât
sur le trou ovalaire d'où il falloit la
déplacer par le secours de la moufle.
J'avoue avec franchise que d'après
l'avis de ces messieurs, et la théorie de
M. Guyenot, je restai flottant et
incertain sur le parti que j'avois à
prendre; je fus tenté de procéder à
une prétendue nouvelle Réduction:
mais j'en perdis l'idée dès que j'eus fait
réflexion 1°. au danger auquel j'exposois
mon malade, en violentant des muscles
déjà tendus, fatigués et irrités par
les premières manœuvres... 2°. à la
certitude où j'étois d'avoir senti la
tête de l'os reprendre le chemin de
sa loge naturelle... 3°. enfin aux
signes qui font connoître la luxation
du fémur sur le trou ovalaire, dont

la plu-part manquoient, puisque 25.
le grand trochanter qui doit être
enfoncé, étoit au contraire plus saillant
que dans l'état naturel; le genou, ni
le pied n'étoient pas tournés en dehors,
et le malade souffroit également,
qu'on lui portât l'extrémité luxée
en dedans, ou en dehors.

Le succès dont furent suivies les
tentatives de mm Guyenot et Louis,
sur leur malade, doit engager les
maîtres de l'art à ne pas regarder
les anciennes luxations comme
incurables, par la raison que les
cavités articulaires peuvent être
remplies d'une synovie épaisse
et concrète; ils doivent au contraire
mettre toujours en usage les moyens
capables de favoriser la réduction.

C'est aux topiques émolliens et
relâchans et aux résolutifs principalem²
que j'ai été redevable de la guérison
de mon malade; et c'est moins aux
opérations chirurgicales qu'au long



usage des bains et des douches d'eau de Luxeuil, pris pendant les deux saisons de l'année 1764. et aux bains dans la décoction émolliente et dans le petit lait, que M. Guyenot doit celle de sa malade.

Je conclus de mon observation qu'il est très essentiel de supposer toujours dans les vieilles luxations une quantité de sinovie amassée et épaisse dans les cavités articulaires, proportionnée à cette ancienneté, non pour abandonner les malades, comme le Conseiltoient les anciens ~~et qui étoient d'usage~~
~~mais pour travailler à~~ relâcher et affoiblir les muscles, afin que rétablis ils permettent à la tête déplacée de rester appuyée sur la sinovie épaisse dans la cavité, jusqu'à ce qu'elle puisse par une pression continue et suffisante vaincre l'obstacle que cette humeur oppose à sa rentrée dans la cavité, et que l'on s'aperçoive par la cessation des accidents et par l'uniformité des deux extrémités, que la luxation est parfaitement réduite.



ARC 15 d 61201

[Handwritten signature]